

Numele pacientului:

Data:

Test de screening GPCOG

Etapa 1: Examinarea pacientului

Dacă nu este precizat altfel, fiecare întrebare se va adresa o singură dată.

Nume și adresă pentru test de memorie ulterior

1. „Am să vă spun un nume și o adresă. După ce le-am spus, aș vrea să le repetați. Vă rog să țineți minte numele și adresa, deoarece o să vă rog să mi le spuneți din nou peste câteva minute: Ion Popescu, strada Dezrobirii nr. 42, Voluntari.”
(Este permis un număr maxim de 4 încercări)

Orientare în timp

2. În ce dată suntem astăzi? (trebuie precizată exact)

corect greșit

Testul desenării ceasului – folosiți o pagină nouă

3. Vă rog să marcați toate numerele care indică orele pe ceas.
(este necesară spațierea corectă).
4. Vă rog să desenați limbile ceasului, astfel încât să arate ora 11:10.

Informații

5. Îmi puteți povesti o știre recentă?
(Recent = în ultima săptămână. Dacă este furnizat un răspuns general, de exemplu "război", "ploi abundente", solicitați detalii. Nu sunt punctate decât răspunsurile exacte)"

Test de memorie

6. Care erau numele și adresa pe care v-am rugat să le țineți minte mai devreme?

Ion

Popescu

Strada Dezrobirii

Nr. 42

Voluntari

(Pentru a calcula scorul total, luați în considerare numărul de răspunsuri corecte)

Scor total (scor maxim: 9)

/9

Dacă scorul pacientului este 9, nu există disfuncție cognitivă semnificativă; nu sunt necesare teste suplimentare.

Dacă scorul pacientului este 5-8, sunt necesare informații suplimentare. Treceți la etapa 2, Chestionarul aparținătorului

Dacă scorul pacientului este 0-4, este sugerată disfuncția cognitivă. Efectuați investigațiile standard.

Interviu cu aparținătorul

Data: _____

Numele aparținătorului: _____

Relația aparținătorului cu pacientul, adică aparținătorul este _____ pacientului/ei

Aceste 6 întrebări verifică starea pacientului comparativ cu starea acestuia/acesteia de acum, să zicem, 5-10 ani

Comparativ cu acum câțiva ani:

	Da	Nu	Nu știu	N/A
• Pacientul/pacienta își aduce aminte mai greu lucruri întâmplare recent decât de obicei?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Îi este greu pacientului/pacientei să își amintească discuțiile peste câteva zile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• În momentul în care vorbește, pacientul/pacienta are dificultăți în a găsi cuvintele potrivite sau tinde să folosească cuvinte greșite mai frecvent decât de obicei?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Are pacientul/pacienta dificultăți în a-și gestiona banii și a-și rezolva unele aspecte financiare (de exemplu plata facturilor, planificarea banilor)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Pacientul/pacienta este mai puțin capabil(ă) să își administreze medicația proprie în mod independent?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Pacientul/pacienta are nevoie de mai mult ajutor în ceea ce privește mijloacele de transport (fie ele private sau publice)? <small>(Dacă are dificultăți numai datorită unor dizabilități fizice, de exemplu un picior paralizat, bifați "nu")</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Pentru a obține scorul total, calculați numărul de întrebări la care s-a răspuns „nu”, „nu știu” sau „N/A”)

Scor total (maximum 6)

/6

Dacă pacientul are un scor total cuprins între 0 și 3, este sugerată disfuncția cognitivă. Efectuați investigațiile standard.

Brody et al, *JAGS* 2002; 50:530-534

Traducere în limba română: Dr. Răzvan Ioan Trașcu